



ADAMA



POWERED BY

Asorbital®

FORMULATION TECHNOLOGY

INOVAȚIE SAU TRADIȚIE?

FORAPRO

Fără egal în controlul făinării!


Două substanțe active, sinergice și complementare, într-o formulare de ultimă generație. Cu activitate sistemică împotriva făinării și a complexului de boli foliare din primele faze de vegetație.


Listen › Learn › Deliver


FORAPRO 425 EC

Substanță activă:
Fenpropidin 250 g/L +
Protiokonazol 175 g/L

Formulare:
Emulsie concentrată (EC)

 **Formulare revoluționară – Asorbital – formulare unică ADAMA, ce asigură o absorbție superioară la nivelul plantei și o eficiență de lungă durată.**

 **Controlează un spectru foarte larg de boli în T1 – septorioză, făinare, rugini.**

 **Eficacitate îmbunătățită a substanței active fenpropidin, asigurând controlul unui spectru larg de boli.**

 **Control excelent al făinării.**

Cultură	Spectru de combatere	Doză de aplicare	Stadiul de dezvoltare	Nr. max. de trat. / cultură / sezon	Volum de apă/ha	Timp de pauză (zile)
Grâu de toamnă Grâu de primăvară	Septorioza grâului (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>) Drechslera tritici-repentis Rugina galbenă (<i>Puccinia striiformis</i>) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>)	0.8 - 1,0 L/ Ha	BBCH 30-65	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Orz de toamnă Orz de primăvară	Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>) Arsura frunzelor de orz (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Sfâșiarea frunzelor (<i>Helminthosporium gramineum</i>) Rugina orzului (<i>Puccinia hordei</i>)	0.8 - 1,0 L/ Ha	BBCH 30-65	1	100-400 l/ha	Nu se aplică
Triticale de toamnă și de primăvară	Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>) Septorioza grâului (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>) Rugina galbenă (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.8 - 1,0 L/ Ha	BBCH 30-65	1	100-400 l/ha	Nu se aplică

FORAPRO 425 EC



Mod de acțiune

Forapro 425 EC este un fungicid sistemic ce este destinat folosirii pentru uz preventiv, curativ și eradicativ în controlul bolilor cauzate de fungi.

Forapro 425 EC conține două substanțe active: fenpropidin din grupa morfoline, FRAC grupa 5 și protoconazol din grupa triazoli, FRAC grupa 3.

Fenpropidin este o substanță ce acționează ca inhibitor de biosinteză a ergosterolului în două locuri țintă (delta 14-reductaza și respectiv delta 8-7 isomeraza), fapt ce permite scăderea riscului dezvoltării rezistențelor.

Protoconazol este o moleculă ce aparține clasei triazolilor, ce conferă tratamentului o acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de agenți patogeni.

RECOMANDĂRI COMERCIALE:


- * **Forapro 425 EC** este disponibil în:
 - ▶ Pachetul Maxentis Pro



Recomandări de aplicare

Fungicidul **Forapro 425 EC** este omologat la cereale, pentru combaterea principalelor boli (septorioză, făinare, rugini) și se utilizează de la începutul fenofazei alungirii paiului (BBCH 30) până la fenofaza de înflorit deplin (BBCH 65). **Forapro 425 EC** oferă cele mai bune rezultate de protecție când este utilizat pentru prima intervenție

în primăvară la culturile de cereale păioase, obținând dintr-o singură aplicare un randament ridicat în cazul presiunilor de boli cu intensitate medie și ridicată. Se aplică maxim un tratament pe aceeași suprafață / sezon, cu echipamente profesionale de tratat și un consum de apă între 100 - 400 L / ha.



*** Rezultate din testele efectuate de ADAMA în Europa.

POWERED BY

Asorbital®

FORMULATION TECHNOLOGY