

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS INSTINCT PRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm





LS INSTINCT PRO este un fungicid sistemic pe bază de protoconazol, spiroxamină și tebuconazol.

Modul de acțiune al celor trei substanțe active asupra unei game largi de patogeni este diferit, și astfel pot fi combătute cu succes formele rezistente la alte fungicide.

Conține: 53 g/l protoconazol + 224 g/l spiroxamină + 148 g/l tebuconazol (CAS protoconazol: 178928-70-6; CAS spiroxamină: 118134-30-8; CAS tebuconazol: 107534-96-3).
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 982PC/07.11.2024

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

PERICOL !

H302: Nociv în caz de înghițir. **H317:** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H318:** Provoacă leziuni oculare grave. **H332:** Nociv în caz de inhalare. **H335:** Poate provoca iritarea căilor respiratorii. **H361D:** Susceptibil de la dăuna fătului. **H373:** Poate provoca leziuni ale organelor (ochilor) în caz de expunere prelungită sau repetată. **H410:** Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată. **EUH401:** Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediul, a se respecta instrucțiunile de utilizare. **P102:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P261:** Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceasta/ vaporii/spray-ul. **P264:** - Spălați-vă fața și mâinile bine după utilizare. **P273:** Evitați dispersarea în mediu. **P280:** A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P308 + P311:** ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. **P314:** Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. **P391:** Colectați scurgerile de produs. **P501:** Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale conform regulamentelor locale. Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane. **SP1:** A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri. **SP3:** Pentru a proteja organismele acvatice și arthropodele care nu sunt vizate, respectați o zonă tampon nepulverizată de 15 m față de corpurile de apă de suprafață.

UFI : SPMN-V475-A409-V4YG

PRIMUL AJUTOR

Informații generale: Când sunați la un număr de urgență, la un centru de informare toxicologică sau la un medic sau când mergeți la tratament, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră ambalajul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate. Scoateți accidentalul din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție stabilă (întinsă pe o parte). Scoateți imediat îmbrăcăminte contaminată și eliminați-o în condiții de siguranță.

Inhalare: Se scoate accidentalul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, faceți respirație artificială. Oferă răniților căldură și fără efort. Sunați imediat un medic sau la un centru de informare toxicologică

Ingerare: În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i ambalajul sau eticheta produsului. Clătiți gura. Nu provocați vărsături. Consultați imediat un medic sau contactați un centru de toxicologie.

Contact cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 și clătiți apoi cu apă. Dacă simptomele persistă se va chema un medic. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.


Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. După primele 5 minute, îndepărtați lentilele de contact, dacă există, apoi continuați să clătiți ochii. Consultați imediat un medic sau contactați un centru de toxicologie.

În cazul oricărei expuneri cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil. **Număr de telefon în caz de urgență medicală:** Centrul de Informare Toxicologică București, S pitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, Tel. de urgență: +40 21 5992300, Email: ati_2@urgentafloreasca.ro. Spitalul Clinic Județean de Urgență Targu Mureș Tel: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexan drescu, Tel : +40 2121 06282; +40 2121 06183.

Informații pentru medic: **Antidot:** Nu există un antidot specific. Se va trata simptomatic. În cazul ingestiei unei cantități importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI în intervalul primelor două ore de ingestie. În toate cazurile se recomandă administrarea de cărbune activ și sulfat de sodiu.

Detinător omologare/Producător: LIFE SCIENTIFIC LTD
 Block 4, Bellfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlanda
 Tel: +353 1 2832024

Lot Nr.: vezi pe ambalaj
 Data fabricației: vezi pe ambalaj
 Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricației



Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS INSTINCT PRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm

MODUL DE ACTIUNE:

LS INSTINCT PRO este un fungicid sistemic pe bază de protioconazol , spiroxamină și tebuconazol.

Modul de acțiune al celor trei substanțe active asupra unei game largi de patogeni este diferit, și astfel pot fi combătute cu succes formele rezistente la alte fungicide.

LS INSTINCT PRO are acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de patogeni, asigurând protecția pe o perioadă lungă de timp. La scurt timp după aplicare, cele trei componente active pătrund în țesuturi, fiind translocate acropetal, prin xilem, în toată planta, inclusiv în țesuturile noi de creștere. Spiroxamina conduce la accelerarea penetrării în plantă și la rezistența la spălare prin precipitații. Protioconazolul se caracterizează printr-o excepțională acțiune preventivă, curativă și eradicativă.

Produsul este recomandat în strategiile antirezistență.

Produsul se utilizează în România conform tabelului de mai jos:

Cultura	Organismul dăunător	Doza de utilizare (L/ha)	Perioada de aplicare	Nr max de tratamente	Interval minim între tratamente	Timp de pauză până la recoltare	Cantitate apa utilizată (L/ha)
Grâu	Făinarea (<i>Blumeria graminis</i>) Pătarea lenticulară (<i>Drechslera</i> spp.) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>) Septorioza (<i>Septoria</i> spp.)	0,6 L/ha	Se aplică de la începutul alungirii paiului și până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30 – 69)	2	14	35 de zile	200-400
	Fusarioza (<i>Fusarium</i> spp.)	0,8 L/ha					
Orz Orzoaică*	Făinarea (<i>Blumeria graminis</i>) Pătarea lenticulară (<i>Drechslera</i> spp.)	0,6 L/ha	Se aplică de la începutul alungirii paiului și până la începutul înfloritului (BBCH 30 – 61)	2	14	35 de zile	200-400
	Fusarioza (<i>Fusarium</i> spp.)	0,8 L/ha					

* Utilizări minore în România conform ordinului MADR nr. 200/2020.

Omologarea acestor utilizări minore s-a realizat fără prezentarea studiilor de eficacitate ale produsului LS INSTINCT PRO. Pentru aceste utilizări, deținătorul omologării nu poartă răspunderea în cazul unor eventuale esecuri în ceea ce privește eficacitatea sau fitotoxicitatea , rezultate din utilizarea produsului.

Eficacitatea este puțin probabil să fi fost demonstrată pentru culturile minore , de aceea în cazul în care produsul de protecție a plantelor LS INSTINCT PRO se utilizează pe aceste culturi , utilizatorii sunt responsabili pentru daunele/riscurile pentru cultură, atât în ceea ce privește eficacitatea , protecția consumatorului cât și pentru siguranța culturilor. Înainte de a utiliza produsul de protecție a plantelor LS INSTINCT PRO pe culturile minore aprobate , utilizatorii trebuie să verifice cu atenție eticheta produsului și să trateze mai întâi o zonă mica.

RECOMANDARI DE UTILIZARE

LS INSTINCT PRO se va aplica la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală. Se aplică 1-2 tratamente foliare terestre, preventiv sau curativ, pe întreaga suprafață. Intervalul minim între tratamente este de 14 zile.

Aplicarea se va face între începutul alungirii paiului și sfârșitul înfloritului (BBCH 30 – 69) pentru grâu și începutul alungirii paiului și începutul înfloritului pentru orz și orzoaică (BBCH 30 – 61).

Ultimul tratament se va face pentru combaterea fusariozei spicelor.

Timp de pauză până la recoltare: 35 de zile.

Numărul maxim de tratamente pe sezon: 2 tratamente.

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS INSTINCT PRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm

COMPATIBILITATE

LS INSTINCT PRO este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare omologate pentru utilizare în România. Înainte de utilizarea unui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate și să se consulte tabelele de compatibilitate.

PREGATIREA SOLUTIEI

Se toarnă cantitatea adecvată de produs, în rezervorul pulverizatorului, umplut pe jumătate cu apă și, în timp ce se agită, se completează rezervorul cu apă până la volumul specificat. Pregătiți doar cantitatea de soluție care va fi utilizată în ziua pregătirii amestecului. Atât pe parcursul pregătirii soluției cât și a aplicării tratamentului agitatorul va funcționa continuu pentru a asigura uniformitatea emulsiei.

TEHNICA DE APLICARE

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a fungicidelor, utilizate în mod obișnuit la cultura de cereale paioase. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și de stadiul de dezvoltare al culturii, respectiv 200 - 400 l/ha.

SPALAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIȚ

După terminarea tratamentului echipamentul de stropit se va spăla bine, cu apă curată cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare. Dacă se utilizează agenți de curățare, urmați instrucțiunile de utilizare ale acestora.

MASURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se va purta obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală.

După terminarea lucrului spălați fața și mâinile cu multă apă și săpun, fără a freca. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere, semințe sau ambalajele acestora. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate sau în zona de acces a animalelor.

Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși rezistente la substanțe chimice, șorț, cizme de siguranță, scut facial sau ochelari de protecție cu ecrane laterale atunci când aplicați produsul.

PRIMUL AJUTOR

Informații generale: Când sunați la un număr de urgență, la un centru de informare toxicologică sau la un medic sau când mergeți la tratament, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră ambalajul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate. Scoateți accidentatul din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție stabilă (întinsă pe o parte). Scoateți imediat îmbrăcăminte contaminată și eliminați-o în condiții de siguranță.

Inhalare: Se scoate accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, faceți respirație artificială. Oferă răniților căldură și fără efort. Sunați imediat un medic sau la un centru de informare toxicologică

Ingerare: În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i ambalajul sau eticheta produsului. Clătiți gura. Nu provocați vărsături. Consultați imediat un medic sau contactați un centru de toxicologie.

Contact cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 și clătiți apoi cu apă. Dacă simptomele persistă se va chema un medic. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. După primele 5 minute, îndepărtați lentilele de contact, dacă există, apoi continuați să clătiți ochii. Consultați imediat un medic sau contactați un centru de toxicologie.

În cazul oricărei expunerii cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil. **Număr de telefon în caz de urgență medicală:** Centrul de Informare Toxicologică București, Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, Tel. de urgență: +40 21 5992300, Email: ati_2@urgentafloreasca.ro. Spitalul Clinic Județean de Urgență Targu Mureș Tel: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, Tel : +40 2121 06282 ; +40 2121 06183.

Informații pentru medic: Antidot: Nu există un antidot specific. Se va trata simptomatic. În cazul ingestiei unei cantități importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI în intervalul primelor două ore de la ingestie. În toate cazurile se recomandă administrarea de cărbune activ și sulfat de sodiu.

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS INSTINCT PRO (RO)	5L - Booklet	130 x 150 mm

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

A nu se imprăstia produsul in apropierea surselor de apă, evitând astfel pericolul contaminării. Nu deversați pe sol/in subsol. După terminarea administrării produsului, toate echipamentele vor fi curățate și decontaminate in locuri special amenajate. Nu se deversează resturi de produs rămas neutilizat in râuri, lacuri sau in alte locuri decât cele special amenajate.

Nu se recomandă spălarea masinilor sau instalatiilor in râuri sau alte suprafețe de apă.

MASURI IN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE

Evitați contactul cu produsul imprăștiat sau cu suprafețele contaminate. Se va folosi echipament de protecție individual.

Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș). Curățați pardoseala și obiectele contaminate, respectând regulamentele de protecție a mediului. Se va păstra in containere inchise și adecvate pentru eliminare.

Nu permiteți ca produsul să pătrundă in ape de suprafață, sisteme de canalizare și ape de adâncime.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire ambalajele vor fi decontaminate prin tripla clătire, golute de continut, uscate, curate și păstrate cu capacele separate, iar apa rezultată se va adăuga la solutia de stropit.

Ambalajele goale trebuie duse la reciclarea locală sau la eliminarea deșeurilor. Nu refolositi ambalajele goale in alte scopuri.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO₂), spumă de stingere, nisip.

Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

În caz de incendiu, pot fi degajate: acid clorhidric (HCl), acid cianhidric, monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NO_x).

Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri: În caz de incendiu și/sau explozie, nu inhalați vapori, utilizați aparat de respirat autonom. Nu permiteți apei de stingere să pătrundă in canale de scurgere sau cursuri de apă. Limitați răspândirea agenților de stingere.

CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT

Se va depozita in recipientul original. Se vor păstra containerele ermetic inchise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

În atenția utilizatorului

Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat in scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Product	Label Contents	Dimensions (WxH)
LS INSTINCT PRO (RO)	5L - Base	150 x 150 mm

LS INSTINCT PRO este un fungicid sistemic pe bază de protoconazol , spiroxamină și tebuconazol. Modul de acțiune al celor trei substanțe active asupra unei game largi de patogeni este diferit, și astfel pot fi combătute cu succes formele rezistente la alte fungicide. Conține: 53 g/l protoconazol + 224 g/l spiroxamină + 148 g/l tebuconazol (CAS protoconazol: 178928-70-6;CAS spiroxamină: 118134-30-8; CAS tebuconazol: 107534-96-3). Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 982PC/07.11.2024

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare!

PERICOL !

H302: Nociv în caz de înghițir. **H317:** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H318:** Provoacă leziuni oculare grave. **H332:** Nociv în caz de inhalare. **H335:** Poate provoca iritarea căilor respiratorii. **H361D:** Susceptibil de a dăuna fătului. **H373:** Poate provoca leziuni ale organelor (ochilor) în caz de expunere prelungită sau repetată. **H410:** Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată. **EUH401:** Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. **P102:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P261:** Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. **P264:** - Spălați-vă fața și mâinile bine după utilizare. **P273:** Evitați dispersarea în mediu. **P280:** A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P308 + P311:** ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. **P314:** Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. **P391:** Colectați scurgerile de produs. **P501:** Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale conform regulamentelor locale. Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane. **SP1:** A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri. **SPe3:** Pentru a proteja organismele acvatice și arthropodele care nu sunt vizate, respectați o zonă tampon nepulverizată de 15 m față de corpurile de apă de suprafață.

UFI : 5PMN-V475-A409-V4YG

PRIMUL AJUTOR

Informații generale: Când sunați la un număr de urgență, la un centru de informare toxicologică sau la un medic sau când mergeți la tratament, asigurați-vă că aveți la dumneavoastră ambalajul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate. Scoateți accidentatul din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție stabilă (intinsă pe o parte). Scoateți imediat îmbrăcăminte contaminată și eliminați-o în condiții de siguranță.

Inhalare: Se scoate accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, faceți respirație artificială. Oferă răniților căldură și fără efort. Sunați imediat un medic sau la un centru de informare toxicologică

Ingerare: În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i ambalajul sau eticheta produsului. Clătiți gura. Nu provocați vărsături. Consultați imediat un medic sau contactați un centru de toxicologie.

Contact cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 și dați apă cu apă. Dacă simptomele persistă se va chema un medic. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. După primele 5 minute, îndepărtați lentilele de contact, dacă există, apoi continuați să clătiți ochii. Consultați imediat un medic sau contactați un centru de toxicologie.

În cazul oricărei expuneri cereți ajutorul medicului și prezentați eticheta dacă este posibil. **Număr de telefon în caz de urgență medicală:** Centrul de Informare Toxicologică București, 5 Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, Tel. de urgență: +40 21 5992300, Email: ati_2@urgentaifloreasca.ro. Spitalul Clinic Județean de Urgență Targu Mures Tel: +40 372 653 100; +40 372 683 700; +40 265 212 111. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexan drescu, Tel : +40 2121 06282; +40 2121 06183.

Informații pentru medic: Antidot: Nu există un antidot specific. Se va trata simptomatic. În cazul ingestiei unei cantități importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI în intervalul primelor două ore de la ingestie. În toate cazurile se recomandă administrarea de cărbune activ și sulfat de sodiu.

Detinator omologare/Producător: LIFE SCIENTIFIC LTD
Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlanda
Tel: +353 1 2832024

Lot Nr.: vezi pe ambalaj
Data fabricației: vezi pe ambalaj
Termen de valabilitate: produsul este valabil 2 ani de la data fabricației

