



INOVAȚIE SAU TRADIȚIE?

LAMDEX EXTRA

Eficient cu efect de șoc și repelență activă

Combate un spectru larg de dăunători din culturile de grâu, rapiță, orz, porumb și floarea-soarelui și are eficacitate sporită împotriva rățișoarei porumbului (*Tanymecus dilaticollis*).

LAMDEX EXTRA

Substanță activă:
Lambda-Cihalotrin 25 g/kg

Formulare:
Granule dispersabile în apă (WG)



Insecticid eficient cu efect de șoc și repelență activă după aplicare



Combate un spectru larg de dăunători din culturile de: grâu, orz, porumb, floarea-soarelui și rapiță



Omologare împotriva rățișoarei (*Tanymecus dilaticollis*)

Cultură	Spectru de combatere	Doză	Stadiul de aplicare	Țimp de pauză
Grâu	Afide (<i>Aphis spp.</i>), <i>Tripsi</i> (<i>Haplothrips tritici</i>), Gândacul ovăzului (<i>Lema melanopa</i>), Viermele roșu al paiului (<i>Haplodiplosis marginata</i>), Musca Suedeză (<i>Oscinella frit</i>)	0,3 kg/ha 10 zile între aplicări	BBCH 11-71	28 zile
Orz				
Rapiță	Viespea rapiței (<i>Athalia rosae</i>), Fluturele alb al verzei (<i>Pieris brassicae</i>), Gărgărița tulpinilor (<i>Ceutorhynchus spp.</i>), Gândacul lucios (<i>Meligethes aeneus</i>), Buha verzei (<i>Mamestra brassicae</i>), Tănțarul silicvelor (<i>Dasineura brassicae</i>), Puricii cruciferelor (<i>Psylliodes chrysocephala/Phyllotreta spp.</i>)	0,3 kg/ha 10 zile între aplicări	BBCH 11-39	28 zile
Floarea soarelui	Gărgărița frunzelor (<i>Tanymecus dilaticollis</i>), Musca Suedeză (<i>Oscinella frit</i>)	0,3 kg/ha 10 zile între aplicări	BBCH 10-19	70 zile
Porumb				7 zile

LAMDEX EXTRA



Mod de acțiune

Insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acțiune de contact și ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicare, substanța activă penetrează rapid cuticula insectei, acționând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează și mor repede.



Recomandări de aplicare

Lamdex Extra se aplică prin stropiri cu echipamente terestre, volumul de apă folosit fiind în funcție de faza de vegetație a culturii tratate, precum și în funcție de echipamentul folosit, evitându-se scurgerea soluției de tratat de pe frunze.

Pentru grâu, orz și rapiță, tratamentele se vor efectua în toamnă, în conformitate cu avertizările locale, pentru fiecare cultură și dăunător, la atingerea pragului economic de dăunare pentru fiecare dăunător în parte. La porumb și floarea-soarelui se aplică tratamente de corecție în vegetație, la cel puțin o săptămână după răsărire sau la densități de 2-3 dăunători/mp. Nu se vor aplica mai mult de 2 tratamente cu produsul **Lamdex Extra** pe sezon. Volumul recomandat este de 200-250 l/ha.

RECOMANDĂRI COMERCIALE:

- * **Lamdex Extra** este disponibil în:
 - ▶ Pachetul Mavrik Extra
 - ▶ Pachetul Esențial Primăvară
 - ▶ Pachetul Sultan
 - ▶ Pachetul Trinity

