



# INOVAȚIE SAU TRADIȚIE?


## PHOENIX

*Fără rezistențe în culturile de cereale!*


Singurul produs cu acțiune multi-site împotriva septoriozelor care au dezvoltat rezistențe.  
Crește inclusiv eficiența produselor partenere.

**Substanță activă:**  
Folpet 500 g/l

**Formulare:**  
Suspensie concentrată (SC)

 **Tehnologie unică multi-site pentru eliminarea rezistențelor dezvoltate de Septoria tritici**

 **Protecția culturii este asigurată de la început**

 **Partenerul ideal în completarea și îmbunătățirea tratamentelor**

Cultură	Spectru de combatere	Doză	Stadiul de aplicare	Temp de pauză
<b>Grâu</b>	Septorioza ( <i>Zymoseptoria tritici</i> )	1,5 l/ha	Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării (BBCH 30-59)	42 zile
<b>Orz</b>	Rincosporioza ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), ramularia ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ), Patarea Reticulara ( <i>Pyrenophora teres</i> )	1,5 l/ha	Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării (BBCH 30-59)	42 zile
<b>Titricale</b>	Septorioza ( <i>Zymoseptoria tritici</i> )	1,5 l/ha	Se aplică de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării (BBCH 30-59)	42 zile

## Mod de acțiune

**Phoenix** este un fungicid cu acțiune de contact multi-site, acționând simultan ca inhibitor al agenților patogeni prin multiple căi biochimice. Substanța activă Folpet are acțiune preventivă de contact, împiedicând instalarea infecțiilor la suprafața organelor tratate prin inhibarea germinăției sporilor și creșterea tubului germinativ, prin procesul biochimic de blocare a metabolismului celular al respirației ciupercilor sensibile.

## Recomandări de aplicare

**Phoenix** se aplică la grâu de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării (BBCH 30-59). Întrerupe ciclul de triazolii în tehnologiile care conțin produse din această clasă, folpet fiind o substanță activă din clasa chimică a ftalimidelor.

## Compatibilitate

**Phoenix** poate fi compatibil cu multe dintre produsele de protecția plantelor folosite în mod curent în România, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Se poate aplica în amestec cu Leander 750 EC la cultura de grâu. Înainte de a efectua orice combinație de produse, se va realiza un test pe cultura respectivă. În mod obligatoriu se vor respecta și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

POWERED BY

**MSI Protech®**