



ADAMA



INOVAȚIE SAU TRADIȚIE?

TIMELINE FX

*Nu poți opri timpul,
dar îl poți controla!*

Erbicid unic de ultimă generație,
cu trei substanțe active, adjuvant și safener
încorporat, în formulare avansată OD,
care oferă cel mai larg spectru de combatere
în culturile de cereale păioase.

TIMELINE FX

Substanță activă:

Florasulam 1,75 g/l
Fluroxipir-meptil 75 g/l
Pinoxaden 30 g/l

Formulare:

Concentrat emulsionabil (EC)



Spectru larg de buruieni combătute, atât graminee cât și buruieni cu frunză lată



Cea mai largă fereastră de aplicare, de la 3 frunze până la frunza standard



Adjuvant și safener (cloquintocet-mexil) încorporat în formulare



Trei substanțe active, foarte selectiv pentru plantele de cultură

Cultură	Spectru de combatere	Stadiul de dezvoltare	Doză	Volum de apă	Nr. max. de tratamente
Grâu de primăvară și toamnă	Buruieni monocotiledonate (<i>Apera spica-venti</i> și <i>Avena fatua</i>) (<i>Alopecurus myosuroides</i> și <i>Lolium sp.</i>)	Postemergent din stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 13-37)	1,5 l/ha 2 l/ha	250 - 400 l/ha	1 aplicare pe sezon
	Buruieni dicotiledonate (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> , <i>Anagallis arvensis</i> , <i>Cyanus segetum</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Fallopia convolvulus</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Vicia sativa</i> , <i>Spergula arvensis</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Cyanus segetum</i> , <i>Myosotis arvensis</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Sinapis sp.</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , etc.)	Postemergent din stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 13-37)	1,5l - 2 l / ha		
Orz de primăvară și de toamnă	<i>Apera spica-venti</i> , <i>Avena fatua</i> , Buruieni dicotiledonate anuale	Postemergent, primăvara, din stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 13-37)	1,5 l/ha	250 - 400 l/ha	1 aplicare pe sezon
	<i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Lolium sp.</i> și buruieni dicotiledonate anuale	Postemergent, primăvara, din stadiul de 3 frunze până la apariția frunzei standard (BBCH 13-37)	2,0 l/ha		



Mod de acțiune

Timeline FX este un produs cu acțiune sistemică, fiind preluat de sistemul libero-lemnos al buruienilor, producând blocarea imediată a dezvoltării meristemelor de

creștere atât la nivelul părții verzi a plantei, cât și la nivelul rădăcinilor. În același timp au loc fenomene de încetinire și blocare a metabolismului celular, fapt ce va conduce

la distrugerea buruienilor într-o perioadă de cca. 3 săptămâni, în funcție de condițiile climatice (temperatură, umiditate, etc.).

TIMELINE FX



Spectru de combatere

Produsul **Timeline FX** este un erbicid sistemic ce combate buruienile monocotiledonate anuale și perene inclusiv *Apera spica-venti*, *Avena fatua*, *Alopecurus myosuroides*, *Lolium sp.* și dicotiledonate anuale din cultura de grâu.



Recomandări de aplicare

Produsul poate fi aplicat, atât toamna, cât și primăvara, în funcție de stadiul de dezvoltare al culturii și al buruienii, când temperaturile nu scad pe timpul nopții sub 7-8 °C (BBCH 13-37). Recomandăm aplicarea produsului atunci când buruienile sunt în faza incipientă de creștere. Majoritatea buruienilor trebuie să fie răsărite.

Utilizați doza de 1,5 l/ha dacă în spectrul buruienilor sunt ovăzul, iarba vântului, traista ciobanului, romanița, rocoina, muștar sălbatic. Utilizați 2 l/ha pentru controlul coada vulpii, lolium, iarba canarului, turița culturii de cereale, albastrele, mac, poligonacee.

Recomandăm aplicarea înainte de final de înfrățit (BBCH 29) cu doza de 1,5 l/ha. După această fază, recomandăm o doză de 2 l/ha.




Compatibilitate

Timeline FX este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare folosite în mod curent în România. Înainte de utilizarea unui amestec se va face un test. Întrucât sortimentul de soiuri și hibrizi de cereale cultivate este în continuă schimbare, este indicat ca amestecurile să fie în prealabil testate din punct de vedere al fitotoxicității pe soiul sau hibridul care urmează a fi tratat. Utilizarea erbicidelor hormonale după aplicarea produsului **Timeline FX** este recomandată a se face după o perioadă de pauză de 7 zile.

Restricții: A nu se amesteca **Timeline FX** cu îngrășăminte foliare deoarece există riscul de apariție a fitotoxicității asupra culturii și a diminuării acțiunii produsului asupra buruienilor. A nu se amesteca **Timeline FX** cu erbicide hormonale și a se respecta timpul de pauză recomandat.

Eficacitate buruieni graminee și buruieni cu frunza lată



Rezultate din testele efectuate de ADAMA în Europa.