



INOVAȚIE SAU TRADIȚIE?

TRINITY

*Curățenia de toamnă se vede
bine în primăvară*

Trei substanțe active ce controlează buruienile
monocotiledonate și dicotiledonate
de la semănat și până la recoltat.

Substanță activă:

Clorotoluron 250 g/l
Diflufenican 40 g/l
Pendimetalin 300 g/l

Formulare:

Suspensie concentrată (SC)



Activitate reziduală de lungă durată



Controlează eficient buruienile monocotiledonate și dicotiledonate, cu răsărire în toamnă și în ferestrele iernii

| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Stadiul de aplicare | Volumul de apă |
|---|--|----------|---|----------------|
| Grâu de toamnă, orz de toamnă, secară de toamnă, triticale de toamnă | Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate | 2,0 l/ha | BBCH 10-13 (de la răsărire până la 3 frunze complet formate) | 200-400 l/ha |



Mod de acțiune

Trinity SC este un amestec complex formulat ca suspensie concentrată, conținând ca substanțe active: 40 g/l Diflufenican, 300 g/l Pendimetalin și 250 g/l Clorotoluron. **Trinity SC** este un erbicid selectiv, cu aplicare în postemergență timpurie, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și a unor monocotiledonate din culturile de cereale de toamnă. Diflufenican aparține grupei chimice a nicotinanilidelor. Este un compus cu acțiune erbicidă de contact și reziduală, absorbit în principal de buruienile aflate în curs de germinare și cu o translocare limitată. Pendimetalin face parte din grupa chimică

a dinitroanilinelor. Se absoarbe prin coleoptil sau hipocotil și acționează prin întreruperea diviziunii celulare și a creșterii celulelor la buruienile sensibile. Clorotoluron este inclus în grupa chimică a fenilureicelor. Este absorbit în principal de rădăcini și, într-o mai mică măsură, prin foliaj, după care este transportat către lăstari și frunze. Este cunoscut ca un compus cu acțiune reziduală de lungă durată.



Recomandări de aplicare

Momentul optim pentru aplicarea tratamentului este toamna, în fenofaza BBCH 10-13 a plantelor de cultură (de la răsărire până la 3 frunze desfăcute). Se aplică un singur tratament cu **Trinity SC** pe aceeași suprafață, într-un sezon. Agitați bine ambalajul produsului înaintea golirii în tank și utilizați agitatorul pe tot parcursul aplicării, pentru o omogenizare optimă.

TRINITY SC



Compatibilitate

Produsul **Trinity SC** poate fi compatibil cu multe dintre produsele folosite în mod curent în România la culturile omologate. Amestecurile vor fi utilizate imediat ce au fost preparate. În mod obligatoriu, se vor respecta și instrucțiunile de folosire a produsului partener. Nu amestecați niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici.

RECOMANDĂRI COMERCIALE:

- * **Trinity SC** este disponibil în:
- **Pachetul Trinity**

O bună pregătire a patului germinativ îmbunătățește efectul pelicular al produsului. După aplicarea erbicidului se vor evita lucrările solului care pot afecta pelicula erbicidului. Efectul rezidual poate fi diminuat în condiții de secetă prelungită. Nu este indicată efectuarea tratamentului cu **Trinity SC** pe culturile afectate de îngheț sau alți factori de stres. După recoltarea culturii, nu există restricții pentru culturile următoare.



Spectru de combatere

Cea mai lungă perioadă de protecție, până la reluarea vegetației în primăvară
Controlează principalele buruieni, inclusiv monocotiledonatele problemă
Acționează radical, pelicular și prin contact
Elimină riscul de apariție a buruienilor rezistente

